




Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.

 **Chiloscyphus**: Du grec *cheilos* (lèvres) et *skupos* (coupe profonde) ; par allusion au périanthe qui présente comme 3 lèvres à son ouverture. **pallescens**: Du latin *pallesco* (pâler), par allusion à sa teinte pâle.

Dans les milieux humides et ombragés: berges, chemins et fossés forestiers. Sur sols basiques à neutres, troncs morts, racines d'arbres (ex. aulnes), cailloux.



Hépatique étalée, vert foncé à vert-brunâtre. Rameaux jusqu'à 6 cm de long et 4 mm de large. Feuilles succubes, plutôt rectangulaires, arrondies ou tronquées voir légèrement bilobées au sommet. Amphigastres plus fins que la tige, à 2 lobes parallèles (loupe, microscope). Sporophytes en mai.

Elle se distingue de *Lophocolea heterophylla* par ses amphigastres moins larges que la tige, à lobes parallèles (loupe) et son absence d'arôme; de *Pedinophyllum interruptum* par ses amphigastres plus visibles (loupe) et ses feuilles à insertion ventrale non arquée (loupe). CH: 2, GE: 1.


Moyennement fréquente. Dispersée à travers le canton. Nouvelle pour le canton par rapport au catalogue bibliographique (Cailliau & Price, 2006).

Aucune.


-

Non menacée [LC].

Voir pour comparaison les Fiches Espèces - *Lophocolea heterophylla* et *Pedinophyllum interruptum*.



Feuilles succubes rectangulaires à arrondies, tronquées.



NISM © (02/2008)