




Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk.

 *Phaeoceros* : Du grec *phaios* (sombre, gris, brun) et *keros* (corne); par allusion à la couleur des sporophyte. *carolinianus* : Etymologie incertaine.

 Dans les milieux ouverts régulièrement perturbés. Sur sol argileux mis à nu, dans les champs moissonnés (surtout chaumes), jachères florales, talus de gravières, parfois dans les prés ras.



 Thalle vert très foncé en rosette, légèrement lobé; diamètre jusqu'à 2 cm. Plusieurs sporophytes en forme de cornes vert-clair jusqu'à 0.7 cm de haut. Spores jaunes. Espèce pionnière apparaissant surtout en automne, souvent avec des sporophytes.

 Se distingue d'*Anthoceros agrestis* par son thalle moins fin, non découpé et ses sporophytes moins longs et vert-jaunâtre. CH: 2, GE: 1.


 **Rare, localisée.** Apparitions sporadiques dans les terrains cultivés. Retrouvée en 2006 pour la première fois depuis la fin du XIX^e.

 Traitements liés à l'exploitation des parcelles agricoles (substances agrochimiques, labour précoce, couverture d'hiver).

 Favoriser les surfaces de compensation écologique, la production agricole intégrée, les réseaux de cordons boisés. Voir la Fiche Habitat - *Les terrains arables*.

 En danger [EN A2b; B1ab (iv)+2ab(iv)] , et dans l'OPN. «Liée aux mesures de compensation écologique.»


 Voir pour comparaison la Fiche Espèce - *Phaeoceros carolinianus*. Voir la Fiche Habitat - *Les terrains arables*.



Thalle lobé.



Sporophytes jaunes à l'extrémité (spores jaunes).



NISM © (02/2008)