

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr.



Cryphaea : Du grec *kruphaio*s (caché) ; par allusion à la capsule presque entièrement camouflée par les feuilles. **heteromalla** : Du grec, *hetero* (différent) et *mallos* (touffe de laine, velu) ; par allusion aux ramifications disposées toutes du même côté, donnant l'aspect d'une petite touffe.

Sur l'écorce des troncs d'arbustes, principalement sur les noisetiers, les sureaux noirs, mais également sur les ormes, les peupliers et les saules. Souvent sur les troncs de diamètre < 15 cm.



Les rameaux de cette espèce font un angle de 45° au moins avec le tronc sur lequel ils poussent. Les capsules, insérées latéralement sur les branches, sont immergées dans les feuilles.

Les rameaux dressés et les capsules latérales en font une espèce aisément reconnaissable.

Aucune confusion possible, en observant bien les caractéristiques principales. Il n'existe qu'une seule espèce du genre à Genève. En Suisse, une autre espèce est mentionnée, *Cryphaea lamyana* (Mont.) C. Müll., mais la présence de cette dernière est sujette à caution. CH:2(1), GE:1.



Rare. A Genève, cette espèce a été trouvée aux alentours de l'embouchure de la Roulave et de l'Allondon, mais également au bord de La Laire et au Nant des Crues. Cette espèce, à distribution principalement méditerranéenne, semble être en légère expansion ces dernières années, mais reste assez localisée dans les zones les plus séchardes de Genève. Espèce nouvelle par rapport au catalogue bibliographique (Burgisser & Price, 2005). A rechercher.

Les coupes d'arbustes dans les zones favorables à l'espèce, telles que les broussailles d'arbustes (souvent de diamètre < 15 cm) aux alentours de l'Allondon et de La Laire. Espèce sensible à la pollution atmosphérique.


Surveiller les rares populations genevoises et laisser quelques zones de broussailles dans les milieux favorables telles que l'Allondon, La Laire et le Nant des Crues. Cette espèce étant relativement facilement reconnaissable, observer s'il existe des populations de *Cryphaea* avant tout débroussaillage. Aux alentours des populations connues, favoriser l'habitat en laissant les brousses d'arbustes (tels que noisetiers ou sureaux noirs, par exemple).

Vulnérable [VU, D2]

(4 stations répertoriées en Suisse, en plus des stations genevoises.)



Les capsules de *Cryphaea heteromalla* sont presque entièrement immergées dans des feuilles (la soie est donc invisible).



NISM © (02/2008)