





Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb.

 *Plagiochila*: Du grec *plagios* (oblique) et *cheilos* (lèvres); par allusion au périanthe dont le haut est comprimé obliquement. *porelloides*: qui ressemble à *Porella*, un autre genre d'hépatiques à feuilles.

Forêt de feuillus et sous-bois de résineux, ripisylves, berges. Sur l'humus, sol en pente, cailloux morainiques, racines d'arbres, écorces à la base des troncs, murs en pierres, dalles de bétons, molasse, souches pourrissantes, conglomérats.



Hépatique à rameaux jusqu'à 6 mm de large et 6 cm de long. Feuilles succubes, ovales, plus longues que larges, dentées (loupe), convexes, dirigées vers le bas. Présence de flagelles (petites tiges sans feuilles). Plante couchée ou dressée.



Se distingue de *Plagiochila asplenioides* par sa taille plus petite et la présence de flagelles (tiges frêles à feuilles rudimentaires). CH: 3, GE: 2.

Assez fréquente.


Aucune.

Non menacée [LC].



Voir pour comparaison la Fiche Espèce - *Plagiochila asplenioides*.



Aspect sec



Feuilles dirigées vers le bas.



NISM © (02/2008)