




 *Fossombronia* : dédiée à Fossombroni, un homme politique de Toscane. *pusilla* : Du latin *pusillus* (tout petit).


 Dans les sites ombragés humides, sentiers équestres forestiers, lisières. Espèce pionnière des sols argilo-sablonneux, sur le sol perturbé (petites dépressions dans la boue).




 Thalle découpé en «feuilles», d'aspect ondulé, vert clair, jusqu'à 1.5 cm de long et étalé au sol. Anthéridies jaunes souvent visibles sur la surface dorsale (loupe). Ressemble à un chou. Sporophytes en été et automne.

 Se distingue de *Fossombronia wondraczekii* (Corda) Dumort. seulement par les spores (microscope), mais les deux espèces sont protégées. CH: 6, GE: 2.


 **Peu représentée**, mais souvent localement assez abondante. Espèce à surveiller. Deux spécimens indéterminés (sans sporophytes) ont été trouvés à Céligny et dans les Bois de Jussy.

 Fermeture et homogénéisation des milieux, abandon des sentiers forestiers en terre.

 Maintenir des zones ouvertes régulièrement perturbées dans les forêts (p. ex: lisières, sentiers en terre ou micro-fossés terreux au bord des chemins).

 Vulnérable [VU, D2].

 Voir pour comparaison la Fiche Espèce - *Fossombronia wondraczekii*.  
Voir la Fiche Habitat - *Les terrains arables*.



Chez *Fossombronia*, les anthéridies (petites boules jaunes) sont bien visibles

